

Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – просьба внимательно ознакомиться!

Совентол® карандаш



Состав

алкоголь денат., ментол, декспантенол, алоэ барбаденсис, полидоканол, смола ксантановая, вода очищенная, кислота лимонная, натрия моногидрофосфат додекагидрат.

Форма выпуска и содержимое

1 упаковка содержит 4 мл геля.

Производитель

МЕДИЦЕ Арцнайmittel Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Куловег 37, 58638 Изерлон,

Телефон: +49 2371/937-0, Факс: +49 2371/937-329, e-мейл: info@medice.de, www.medice.de

Показания к применению

Благодаря своему охлаждающему эффекту Совентол® карандаш применяется для локального облегчения зуда и жжения, напр., после укусов насекомых и солнечных ожогов.

Противопоказания

Когда Вам не следует применять Совентол® карандаш?

Совентол® карандаш нельзя применять:

- при повышенной чувствительности к одному из компонентов
- на поврежденной коже или ранах

Меры предосторожности при применении и предостережения

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать?

Совентол® карандаш нельзя применять у детей на больших участках кожи.

У детей моложе 2 лет Совентол® карандаш нельзя применять на лице или шее.

Не применять вокруг или в непосредственной близости от глаз.

При случайном проглатывании крышечки может возникнуть удушье. В этом случае немедленно обратитесь к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Какие другие медицинские продукты или лекарственные средства оказывают влияние на действие Совентол® карандаша или их действие подвергается воздействию?

Обратите внимание на то, что эти данные могут также относиться и к тем лекарственным средствам или другим медицинским продуктам, которые применялись Вами недавно.

Высвобождение действующих веществ из других препаратов, применяемых на коже, и их всасывание в кожу при применении Совентол® карандаша могут быть усилены. Поэтому не следует использовать Совентол® карандаш на одном и том же участке кожи вместе с другими препаратами, применяемыми на коже.

Рекомендации по дозировке, способ и длительность применения

Как и как часто Вам следует применять Совентол® карандаш?

Совентол® карандаш используется для точечного нанесения на пораженные участки кожи.

Благодаря своему охлаждающему эффекту он быстро облегчает зуд. Когда действие ослабевает, можно повторить применение таким же образом несколько раз в день.

Одновременно специальная формула из высококачественных компонентов, таких как алоэ вера и пантенол, ухаживает за раздраженной и зудящей кожей и успокаивает ее.

Побочные эффекты

Какие побочные эффекты могут возникнуть при применении Совентол® карандаша?

Если Вы заметите какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему фармацевту или производителю препарата. Это также относится к побочным эффектам, не перечисленным в данной инструкции по применению.

Совентол® карандаш, как правило, хорошо переносится. В редких случаях при соответствующей повышенной чувствительности возможны кожные реакции.

Рекомендации и данные по сроку и условиям хранения медицинского продукта

Совентол® карандаш следует хранить в местах, недоступных для детей!

Пожалуйста, следите за тем, чтобы карандаш был хорошо закрыт после применения, для того чтобы избежать его высыхания.

Дата срока годности указана на карандаше и на картонной коробке.

Не применяйте Совентол® карандаш по истечению этой даты!

После вскрытия Совентол® карандаш может храниться 6 месяцев.

Состояние информации

Май 2015

Пояснение символов на упаковке



Использовать до



Номер партии



Соблюдать инструкцию по применению



Медицинский продукт

Фармацевтическое предприятие и производитель

МЕДИЦЕ Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ

Куловег 37

D-58638 Изерлон

Телефон: +49 (0) 2371 937-0

Факс: +49 (0) 2371 937-329

е-мейл: info@medice.de

www.medice.de