

Traducción no oficial del prospecto en alemán

PROSPECTO - ¡Leer con atención!

Soventol® Stift



Composición

Alcohol desnaturalizado, mentol, dexpanthenol, Aloe Barbadensis, polidocanol, goma xanthan, agua purificada, ácido cítrico, fosfato de sodio dibásico dodecahidratado.

Presentación y contenido

1 envase contiene 4 ml de gel.

Fabricante

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn,

teléfono: +49 2371/937-0, fax: +49 2371/937-329, correo electrónico info@medice.de,

www.medice.de

Uso previsto

Por su efecto refrescante Soventol® Stift se usa para el alivio local del picor y la quemazón, p. ej., en picaduras de mosquitos o quemadura solar.

Contraindicaciones

Cuándo está contraindicado el uso de Soventol® Stift

No use Soventol® Stift:

- en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes
- sobre la piel lesionada o heridas

Medidas de precaución para el uso y advertencias

Medidas de precaución a tener en cuenta

Soventol® Stift no debe usarse en áreas extensas en niños.

En niños menores de 2 años Soventol® Stift no se debe usar en la cara o el cuello.

No usar en los ojos o cerca de ellos.

La ingestión accidental del tapón puede provocar asfixia. En este caso se debe acudir inmediatamente al médico.

Interacciones

Productos sanitarios o medicamentos que influyen sobre la acción del gel Soventol® Stift o que pueden ver alterado su efecto

Tenga en cuenta que esta información puede ser válida también para medicamentos o productos sanitarios utilizados recientemente.

Soventol® Stift puede intensificar la liberación de los principios activos de otros preparados cutáneos y su absorción cutánea. Por eso, Soventol® Stift no se debe usar con otros preparados cutáneos en el mismo lugar.

Posología, modo y duración del uso

Modo y frecuencia de uso de Soventol® Stift

Soventol® Stift se aplica de manera puntual en las zonas de piel afectadas. Su efecto refrescante alivia rápidamente el picor. La aplicación se puede repetir tan pronto como empiece a desaparecer el efecto. Al mismo tiempo, la fórmula especial de sus componentes de alta calidad, como el aloe vera y el pantenol, cuidan de manera duradera la piel dañada y calman el picor.

Efectos adversos

Qué efectos adversos se pueden producir durante el uso de Soventol® Stift

Si experimenta efectos adversos consulte a su farmacéutico o al fabricante. Incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Por lo general, Soventol® Stift es bien tolerado por la piel. En casos poco frecuentes pueden producirse reacciones cutáneas si hay hipersensibilidad.

Indicaciones e información sobre la caducidad y la conservación del medicamento

Mantener Soventol® Stift fuera de la vista y del alcance de los niños.

Asegúrese de cerrar bien el producto después del uso para evitar que se seque.

La fecha de caducidad está impresa en el lápiz y en el envase de cartón.

No utilice Soventol® Stift después de esta fecha.

Una vez abierto Soventol® Stift se puede usar durante 6 meses.

Fecha de la información

Mayo 2015

Explicación de los símbolos del envase



Fecha de caducidad



Código de lote



Tener en cuenta el prospecto



Producto sanitario

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Teléfono: +49 2371 937-0

Fax: +49 2371 937-329

Correo electrónico: info@medice.de

www.medice.de